

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 10-3-72 286686

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

N° 137 - Février 1972  
Abonnement Annuel  
2ème supplément

régions 1,2,8,9,16,12,13,14,18,19

## ABRICOTIER

La floraison s'accomplit dans des conditions difficiles, températures basses se relevant irrégulièrement en milieu de journées, hygrométrie très élevée marquant des chutes passagères importantes mais très brèves, en Roussillon et dans le Narbonnais ; les baisses d'hygrométrie sont de plus longue durée dans les régions soumises à l'influence du Mistral.

Le Monilia se développe donc favorablement et quelques fleurs détruites ont déjà été observées.

Nous conseillons le renouvellement immédiat de la protection.

## PECHER

Le renouvellement de la protection contre le Monilia s'impose également sur cette espèce.

## OLIVIER

Des feuilles minées par la Teigne (début d'attaque) ont été récemment découvertes en abondance dans une plantation négligée du Minervois.

Dans les olivettes où l'on observerait plus de dix pour cent des feuilles lésées par la Teigne, nous recommandons l'exécution d'un traitement insecticide à l'aide d'Arséniate de plomb, de Carbaryl ou d'un insecticide organo-phosphoré.

LL. TROUILLON,

## POMMIER

En 1971, la Tavelure du pommier a causé d'importants dégâts, les conditions climatiques ayant favorisé son développement.

Rappelons que ce champignon hiverne sur les feuilles mortes et que, à partir de ces feuilles, il y a émission de spores (ascospores) qui vont contaminer les jeunes organes de l'arbre dès que l'humectation est suffisante.

Les risques de contamination sont très importants et des projections sont déjà enregistrées.

Dès que les pommiers auront atteint le stade C - C3 il sera nécessaire de pulvériser un fongicide efficace contre la Tavelure.

Dans le cas où le traitement d'hiver n'a pas été effectué, ajouter à la bouillie un insecticide du type Lindane pour lutter contre les pucerons.

## POIRIER

Appliquer le même traitement sur le poirier.

l'Inspecteur : P. BERVILLE

M. BEZUT

Tirage du 8 Mars 1972 - 2 250 exemplaires - Précédent bulletin N°137 (1er sup.) du 29 Février  
Imprimerie de la Station du Languedoc - Directeur-gérant : L. Bouyx

77